

Endoskopické vyšetření tlustého střeva pomocí kapsle PillCam® Colon – Pokyny pro pacienta

Váš lékař dospěl k názoru, že byste měl/a pro posouzení stavu vašeho tlustého střeva absolvovat vyšetření, které lékaři umožní nahlédnout dovnitř střeva. Takové vyšetření se provádí pomocí PillCam video kapsle, která pořizuje obrazovou dokumentaci při průchodu vaším zažívacím traktem.

Kvalita obrazu je přímo závislá na absolutním vyčištění tlustého střeva. Proto je velmi důležité pečlivě uposlechnout veškeré zde uvedené pokyny, které zajiští, že vaše střevo bude pro toto vyšetření čisté.

Před dnem vyšetření

- Pozorně si přečtěte tyto pokyny. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte vašeho lékaře.
 - Přesně dodržujte pokyny týkající se stravy. Nejezte a nepijte nic, co není obsaženo ve vašem plánu stravování.
 - Pro snadnější konzumaci je doporučeno projímací nápoj vychladit.
- ## V den vyšetření
- Oblékňte si volné dvoudílné oblečení. Oblékněte si tmavou košili, přes kterou nebudete prosvitat světlo.
 - Přesně dodržujte pokyny, které jste obdrželi od vašeho ošetřujícího lékaře.
 - Se záznamníkem dat zacházejte opatrně. Vyhnete se nenaďalým pohybům a nárazům.
 - Za žádných okolností zařízení během vyšetření neodstraňujte nebo neodpojíte.
 - Nevystavujte se slunečnímu záření.
 - Nevystavujte se silnému elektromagnetickému záření, jako je magnetická rezonance nebo např. amatérské radiopřijímače po celou dobu od spolknutí po vyloučení kapsle.

Po ukončení vyšetření

- Vyšetření je považováno za ukončené poté, co kapsle opustí Vaše tělo nebo modrý světelní indikátor na záznamníku dat přestane blikat (obvykle zhruba 10 hodin po spolknutí kapsle).

Varování:
Pokud máte během vyšetření nucení na zvrazení, bolesti břicha nebo zvrácení, neprodleně kontaktujte ošetřujícího lékaře.

Strava z čirých tekutin

✓ Doporučeno*:

- Voda/bublinková voda.
- Čaj bez mléka nebo smetany
- Černá káva bez mléka nebo smetany
- Čiré nealkoholické nápoje
- Čiré džusy bez dužiny (např. jablčný, hroznový nebo brusinkový)
- Káva a čaj s mlékem nebo smetanou
- Čiré polévky
- *pokud možno bez cukru

Bezezbytková strava

✓ Doporučeno:

- Výrobky z bílé mouky (chléb, housky, těstoviny, atd.)
- Bílá rýže, kukuričná mouka, Brambory
- Vejce
- Olej (olivový, řepkový, sojový)
- Margarin, máslo, majonéza
- Mléčné výrobky (výjima jogurtu s ovocem)
- Čistý kuřecí vývar (bez zeleniny a ne z instantní směsi)
- Kuře, kruta, ryby, tuňák, sardinky (bez koření jako je oregano, bazalka atd.)
- Čaj, kava, mléko, cukr, umělá sladidla
- Čokoláda a bonbóny (bez ovoce a ořechů)

Odstranění senzorové sady

Upozornění:


Nesnímejte zařízení do té doby než k tomu budete vyzváni vysetřujícím lékařem.

1. Přilepená čidla odlepte tahem za neplňanou část tak je znázorněno na obrázku. Čidla ponechejte v obalu.

Netahejte za kabely a nevylímejte senzory z obalů !

2. Vyneďte záznamník dat z ramenního pásu nebo z opasku.
3. S vybavením zacházejte opatrně.

S vratě veškeré vybavení (zážnamník dat, sadu čidel a ramenní páš nebo opasek) ošetřujícímu personálu.



Endoskopické vyšetření tlustého střeva pomocí kapsle PillCam® Colon – Individuální režim stravování

Jméno pacienta:

Čas příchodu:

卷之三

Den	Čas	Činnost	Předepsaný materiál a množství	Strava
— dny před Datum: ___ / ___ / ___				Bezezbytková strava celý den
1 den před Datum: ___ / ___ / ___				Strava z čirých tekutin celý den
		Pítí laxativ (a vody)		
		Pítí laxativ (a vody)		
		Pítí laxativ (a vody)		
		Tableta prokinetikum		
		Polknutí kapsle PillCam® COLON (zapít sklenici vody)		
V den vyšetření Datum: ___ / ___ / ___				Strava z čirých tekutin Od: polknutí kapsle Do: prvního jídla
		Pítí laxativ (navýšení č. 1) * (a vody)		
		Pítí laxativ (navýšení č. 2) * (a vody)		
		Jídlo *		
		Čípek *		

*Čas může být vašim ošetřujícím lékařem změněn v průběhu vyšetření, v závislosti na rychlosti přechodu kapsle vaším zažívacím traktem.

PillCam® je registrovaná obchodní značka firmy Given Imaging, Ltd.

